Description d'un Histéride nouveau du Cameroun,

par M. H. Desbordes,
Correspondant du Muséum.

Hister alticola nov. sp.

Ovatus, parum oblongus, niger, nitidus. Fronte plana, stria leviter retro-angulata antice elevata, mandibulis concavis. Pronoto lævi, haud ciliato, stria interna integra, externa antice tantum notata. Elytris, stria subhumerali interna humerum attingente, dorsalibus tribus primis integris, 4ª apicali brevi, 5ª suturalique deficientibus. Propygidio haud dense nec fortiter, pygidio levissime basi tantum, punctatis. Mesosterno leviter emarginato. Tibiis anticis 3-dentatis. Long. 4 mm. (capite et pygidiis exclusis).

Type : un exemplaire récolté en 1924 par le Dr Gromier au Cameroun, Haut-Plateau de Dehang (1,500 m. d'alt.), pendant la saison sèche et appartenant au Museum national d'Histoire naturelle.

Cette espèce est voisine des *Hister amphystrius* Mars., et *niloticus* Mars., dont elle a la taille réduite, la strie frontale rétroangulée, les mandibules concaves, le mésosternum faiblement échancré. Elle s'en distingue par la 4e strie dorsale des élytres réduite à un rudiment apical, l'absence totale de 5e strie et de strie suturale, la ponctuation du pygidium extrêmement fine et concentrée à la base, laissant lisses au moins les 4/5 postérieurs de ce segment.

Il n'existe qu'une dizaine environ d'*Hister* connus d'Afrique tropicale ayant une strie subhumérale interne, les trois premières stries dorsales entières et la suturale nulle. *Hister alticola* ne peut être confondu avec aucun d'eux.